

**PROVINCIA DE FORMOSA**  
*(Chordeiles minor)*

<b>Localidad</b>	<b>Departamento</b>	<b>Coordenadas</b>	<b>Referencias</b>	<b>Comentarios</b>
Citado para la provincia			(de la Peña, 2020:219); (Contreras, 1987; citado en de la Peña, 2020:219); (Contreras et al., 2014:305)	Estacional (octubre a febrero). Ambas subespecies <i>C. m. minor</i> y <i>C. m. chapmani</i> sobreponen sus áreas de presencia en el verano austral.
P. N. Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 3' 55.116''S, 58° 8' 13.74''O	S.I.B.	Presencia sin validar
Reserva Natural Formosa	Bermejo	24° 16' 25.176''S, 61° 48' 2.556''O	S.I.B	Presencia regular
Pozo Cercado (Reserva Wichi)	Ramón Lista	23° 02'S, 62° 20'O	(Bodrati & Areta, 2010:68)	Areta obs. 1 individuo solitario y 1 pareja en vuelo, en diciembre de 2003
El Cantor	Formosa	23° 27'S, 62° 15'O	(Bodrati & Areta, 2010:68)	Areta obs. 4 individuos en vuelo