PROVINCIA DE CÓRDOBA *(Setopagis parvula)*				
Localidad	**Departamento**	**Coordenadas**	**Referencias**	**Comentarios**
Citado para la provincia			(Salvador et al., 2016:12; Salvador et al., 2017:50; Stempelman & Schultz, 1890:395; Zotta, 1944)	Permanente – visitante estival?; Frecuente; En toda la Provincia a excepción del SE (sí en zona Altoserrana); Nidificante entre octubre y febrero-marzo
Río de Los Sauces	Calamuchita	32º 31′ 40″S, 64º 35′ 18″O	(Haro & Gutiérrez, 1992:216)	En bosque forestado de pinos
Parque Nacional Quebrada del Condorito	Punilla, San Alberto y Santa María	31° 41' 51.396''S, 64° 46' 59.916''O	(Miatello et al., 1999; * S.I.B.)	* Presencia marginal
Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala	Cruz del Eje, San Alberto, San Javier, Punilla, Calamuchita	Entre 31º 17' 53”/ 32º 04' 24”S, y 64º 40' 13”/ 64°59'45”O	(Miatello et al., 1999)	
Villa María	Gral San Martín	32º 24’S, 63º 14’O	(Salvador & Bodrati, 2013:22; Salvador & Salvador, 2015:10)	Se encontraron 8 nidos (1980-2005); Frecuente, permanente; bosques, costas y Río Tercero; arboledas exóticas; Nidificante.
Miramar	San Justo	30º 53’S, 62º 40’O	(Salvador & Bodrati, 2013:22)	Se encontraron 3 nidos (1980-2005)
Ballesteros	Unión	32º 32’S, 62º 58’O	(Salvador & Bodrati, 2013:22)	Se encontró 1 nido (1980-2005)
Reserva Natural Chancaní	Pocho	31º 24'S, 65º 27'O	(Sferco & Nores, 2003:24)	Frecuente. Individuos aislados en el bosque y en zonas abiertas. Observada o detectada por el canto. Permanente.
Morteros	San Justo	30º 42’S, 62º 00’O	(de la Peña, 1990)	Observado por el autor
Parque Nacional Traslasierra	Minas	30º 59' 40.848''S, 65º 37' 36.12''O	(S.I.B.)	Presencia sin validar