

PROVINCIA DE FORMOSA
(*Setopagis parvula*)

Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia			(Contreras, 1987; Contreras et al., 2014:313; Di Giacomo, 2005:301; Nores et al., 1991:172)	Localmente es una especie poco común, aunque podría existir cierto grado de sub-observación, que cuenta con registros dispersos en todo el territorio provincial. Parece ser más rara en los interfluvios áridos. Migrante austral que aparece regularmente todos los años. Las fechas extremas registradas de su presencia fueron 5 de octubre y 19 de marzo.
El Cantor	El Chorro	23° 27'S, 62° 15'O	(Bodrati & Areta, 2010:69)	Areta observó sobrevolando un individuo en el lugar.
SE del Dto Laishi, a lo largo Ruta9 que une Colonia Cano con Gral Mansilla sobre la RN11	Laishi		(Contreras, 1993:5)	Un ejemplar avistado en noviembre 1993
Parque Nacional Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 12'S, 58° 00'O	(Di Giacomo, 2005:301; López Lanús 1997:41; S.I.B.)	Dos registros para enero y noviembre. Probable rediente y nidificante. Isletas de monte, selvas en galería, áreas abiertas y caminos con palmares. Solitaria; lugar de avistamiento sin especificar. Otros datos bibliográficos para Formosa son para septiembre, octubre y diciembre. Poco común. Nido en diciembre 1998. (S.I.B.) presencia sin validar
Reserva Natural Formosa	Bermejo	24° 19'S, 61° 43'O	(Chébez et al., 1998; S.I.B.)	(S.I.B.) presencia regular
Tapikiolé (actual Urbana Vieja)	Pilagá	25° 01'S, 59° 19'O	(Laubmann, 1930:161)	Se obtuvo un ejemplar el 9 de diciembre de 1925
Riacho Pilagá desde Mojón de Fierro, río arriba a 3km (ida y vuelta)	Formosa	26° 1' 27.552"S, 58° 4' 12.143"O	(López-Lanús & Mencia, 2017:26)	Avistado en selva e islotes de monte a lo largo de la navegación
Estancia Clarín	Pilcomayo	25° 40'S, 58° 00'O	(Narosky & Martelli, 1995:29)	Escuchadas vocalizaciones en octubre de 1991
Estancia La Marcela	Pirané	26° 17'S, 59° 08'O	(Pagano & Salvador, 2017)	Avistado en septiembre