PROVINCIA DE *(Setopagis parvula)*				
Localidad	**Departamento**	**Coordenadas**	**Referencias**	**Comentarios**
Citado para la provincia			(Contreras et al., 1994:9)	Escasos registros en la provincia; ausente en temporada fría, aunque se concentra en otras NE Corrientes y Este de Pcia de Chaco
Parque Provincial Cruce Caballero	San Pedro	26º 31’S, 54º 00’O	(Bodrati et al., 2010a:57)	Verano, Escaso; avistada pareja copulando en el suelo
Posada Puerto Bemberg (Puerto Libertad)	Iguazú	25º 55’S, 54º 37’O	(Bodrati et al., 2012a:73; Bodrati, 2012b:46)	Visitante estival; escaso; en plantaciones, capueras, jardines y parques
Departamento Iguazú			(Chébez, 1996:134)	
Departamento Oberá			(Chébez, 1996:134)	
Departamento General Manuel Belgrano			(Chébez, 1996:134)	
Departamento Capital			(Chébez, 1996:134)	
Departamento San Ignacio			(Chébez, 1996:134)	
Departamento Candelaria			(Chébez, 1996:134)	
Fachinal	Candelaria	27º 38’S, 55º 43’O	(Contreras et al., 1994:9)	Observado
Gobernador Roca	San Ignacio	27º 11′ 24.62″S, 55º 28′ 8.75″O	(Contreras et al., 1994:9)	Observado
Dos Hermanas	Gral Belgrano	26º 17’S, 53º 45’O	(Contreras et al., 1994:9)	Observado
Profundidad	Candelaria	27º 33′42.48″S, 55º 42′ 16.03″O	(Contreras et al., 1994:9)	Recolectado un macho
Centro ciudad de Posadas	Capital	27º 21' 43.668''S, 55º 54' 3.131''O	(Contreras et al., 1994:9)	Recolectado un macho
INTA-Campo Anexo El Zaimán y del Campus Universitario	Capital	27º 25' 50.808''S, 55º 53' 36.816'' O	(Krauczuk, 2005:16)	En pajonales mesófilos.
Municipios de Corpus Christi, parte SO de Santo Pipó y parte NO de Gobernador Roca	San Ignacio	27º 07’ 56.15”S, 55º 28’ 1.97”O	(Krauczuk, 2008:33)	Avistado en yerbales, campos de ganadería y asentamientos humanos.
Parque Nacional Iguazú	Iguazú	25º 40' 6.096''S, 54º 18' 37.908''O	(* Saibene et al., 1996:34; ** S.I.B.)	*Escaso; visitante estival; ** presencia sin validar
Reserva Natural Estricta San Antonio	Gral M. Belgrano	26º 1' 1.524’’S, 53º 47' 23.532''O	(S.I.B.)	Presencia sin validar
Campo San Juan	Candelaria	27º 24'S, 55º 37’O	(Krauczuk, 2000:85)	Nido en pastizal, con 1 solo huevo