PROVINCIA DE TUCUMÁN ***(Setopagis parvula)***				
Localidad	**Departamento**	**Coordenadas**	**Referencias**	**Comentarios**
Citado para la provincia			(Antelo & Brandán, 2013:99; * Brandán & Navarro, 2009:32)	* Residente, poco observable
Concepción	Chicligasta	27º 20'S, 65º 33'O	(* Antelo & Brandán, 2013:99; Friedmann, 1927:180)	* Material estudiado, 1910
El Saladillo	Trancas	26º 32'S, 65º 15'O	(Antelo & Brandán, 2013:99)	Material estudiado, 1946
Río Chulca	Trancas	26º 12'S, 65º 27'O	(Antelo & Brandán, 2013:99)	Material estudiado, 1957
San Pedro de Colalao	Tafí del Valle	26º 22'S, 65º 57'O	(Antelo & Brandán, 2013:99)	Material estudiado, 1963
San Miguel de Tucumán	Capital	26º 49' S, 65º 13'O	(Antelo & Brandán, 2013:99)	Material estudiado, 1989 y 1990
Santa Ana	Río Chico	27º 28’S, 65º 41’O	(Hartert & Venturi, 1909:225)	Material recolectado por Baer, 1902.
Sierra de San Javier	Tafí Viejo	26º 41'S, 65º 23'O	(Ortiz & Aráoz, 2014; Vides Almonacid, 1993)	