

**PROVINCIA DE SALTA**  
**(*Antrostomus rufus saltarius*)**

Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia			(Moschione et al., 2012:23; Olrog, 1979:135)	En Chaco y Yungas; común, residente; nidifica en la provincia
Embarcación	Gral J. De San Martín	23° 11'S, 64° 12'O	(Salvador et al., 2014:54)	2 huevos a 30 m del cauce del Río Bermejo
43 kilómetros al oeste-sudoeste de San Ramón de la Nueva Orán	Orán			* <i>A. r. rutilus</i>
Juntas del Río Bermejo y Tarija	Orán		(* Olrog, 1979:135)	* <i>A. r. saltarius</i> , en vegetación boscosa junto a cursos de agua
Forestal Rio Seco	Gral J. De San Martín	22° 31'S, 64° 00'O	(* Pagano & Salvador, 2017:29)	* <i>A. r. saltarius</i> ,
Parque Nacional Baritú	Santa Victoria	22° 34' 55.164"S, 64° 38' 39.192"O	(S.I.B)	<i>A. r. saltarius</i> , presencia regular
Parque Nacional El Rey	Anta	24° 42' 1.656"S, 64° 37' 38.424"O	(* S.I.B; ** Babarskas et al., 1995)	* <i>A. r. saltarius</i> , presencia regular; ** <i>A. r. saltarius</i> citado para el parque
Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos	Santa Victoria	22° 15' 56.916"S, 64° 45' 11.124"O	(S.I.B)	Presencia regular
Reserva Nacional Pizarro	Anta	24° 10' 12"S, 64° 3' 44.964"O	(S.I.B)	Presencia regular
Área de Acambuco	Gral J. De San Martín	22° 10' 33.5"S, 63° 54' 44.4"O	(* Coconier et al., 2007:58; ** Nores; citado en Coconier et al., 2007:58)	<i>A. r. saltarius</i> ; * Registrado en todos los puntos durante las campañas de primavera y verano, aunque en bajas densidades; ** un macho recolectado en selva montana
Piquirenda Viejo	Gral J. De San Martín	22° 20'S, 63° 47'O	(Olrog, Barquez y Guerrero; citados en Coconier et al., 2007:58)	<i>A. r. saltarius</i> ; 10 km al norte de Tartagal en noviembre de 1984