

**PROVINCIA DE FORMOSA**  
*(Hydropsalis torquata)*

<b>Localidad</b>	<b>Departamento</b>	<b>Coordenadas</b>	<b>Referencias</b>	<b>Comentarios</b>
Citado para la provincia			(Contreras, 1987; Contreras et al., 2014:315)	Registros de junio a octubre
Riacho Pilagá	Formosa	26° 05'S, 57° 59'O	(Capllonch et al., 2015:78)	Observamos individuos entre el 30 de julio y 3 de agosto de 2004
Reserva Nacional Formosa	Bermejo	24° 18' 41.076"S, 61° 48' 45.648"O	(Chebez et al., 1998)	
Curso bajo del Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 14' 23.28"S, 57° 44' 37.031"O	(Kerr, 1892: 134)	La registró como "común" en el bajo curso del Río Pilcomayo en 1890.
Las Lomitas	Patiño	24° 42' 26"S, 60° 35' 40"O	(Contreras et al., 2014:315)	Obs. el 2/12/1990 por Moschione, F. N.
Reserva El Bagual (áreas abiertas de Cancha Bolivia)	Laishi	26° 10'S, 58° 56'O	(Di Giacomo, 2005:302)	Poco común
Colonia Mihanovitch	Pilcomayo	25° 45'S, 57° 50'O	(Grant, 1911: 319)	Recolectado 1 ejemplar el 12/08/1909
Parque Nacional Río Pilcomayo (Laguna Blanca)	Pilcomayo	25° 9' 23.832"S, 58° 9' 24.335"O	(López Lanús, 1997:41)	Sólo dos registros para enero y noviembre; escasa, probable residente. En isletas de monte, selvas en galería, y caminos en áreas modificadas por el hombre
Campo Serventi	Pilcomayo	25° 10' 44.976"S, 58° 4' 30.972"O	(López Lanús, 1997:41)	Observado
Estancia La Marcela	Pirané	26° 17' S, 59° 08' O	(Pagano & Salvador, 2017:29)	Observado en agosto y septiembre
Bañado La Estrella	Ramón Lista, Bermejo y Patiño	24° 39' 25.873"S, 60° 30' 55.645"O	EcoRegistros	2 registros