

PROVINCIA DE TUCUMÁN
(Hydropsalis torquata)

Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia			(* Hartert & Venturi, 1909:224; ** Brandán & Navarro, 2009:32; Meyer de Schawensee, 1971:125)	* Una serie de tucuman (L. Dinelli) de pieles recolectadas en la provincia; ** Migrante parcial, nidifican en el sur de Argentina y llegan al norte durante el invierno sin salir del país. Frecuente o fácil de ver;
San Felipe	Lules	26° 53'S, 65° 14'O	(Alabarce & Antelo, 1996)	
El Duraznito	Tafí Viejo	26° 39' 53.924"S, 65° 11' 0.341"O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Observado
El Bañado	Tafí del Valle	26° 21'S, 65° 56'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Observado
Vipos	Trancas	26° 29'S, 65° 19'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 H (1899) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Toro Muerto	Graneros	27° 35'S, 65° 20'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1M y 1 H (1910) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
San Pedro de Colalao	Trancas	26°15' S, 65° 30'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado de 1946, 1950, 1956, 1957, 1958 y 1963 (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
El Guardamonte	Leales	27° 21'S, 65° 05'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M (1948) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Cerro San Javier	Yerbabuena	26° 48'S, 65° 23'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 H (1956) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Dos Pozos	Graneros	27° 39' 57.778"S, 65° 7' 21.735"O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M y 1 H (1957) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Río Cuevas	Trancas	26° 21'S, 65° 40'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M (1957) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Quebrada de Tala Yaco	Trancas	26° 26'S, 65° 11'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M (1958) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)

Zárate Norte	Trancas	26° 12'S, 65° 25'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 2 M (1962) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Las Mesadas	Trancas	26° 19'S, 65° 32'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M (1962) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Las Chuñas	Trancas	No ubicado	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 m (1958) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Alisos Grandes	Trancas	No ubicado	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 M (1963) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
San Miguel de Tucumán	Capital	26° 49' S, 65° 13'O	(Antelo & Brandán Fernández, 2013:99)	Material estudiado: 1 H (1967) (pieles colectadas en la provincia y depositadas en la Colección Ornitológica Fundación Miguel Lillo)
Finca Abra Rica	Leales	27° 06'S, 64° 49'O	(Capllonch et al., 2015:78)	Capturada 1 H (Nov. 2001) con placa incubatriz
Sierra de San Javier	Lules	26° 51'S, 65° 21'O	(Vides-Almonacid, 1993)	