

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES**  
*(Podager nacunda nacunda)*

<b>Localidad</b>	<b>Partido</b>	<b>Coordenadas</b>	<b>Referencias</b>	<b>Comentarios</b>
Citado para la provincia			(Zotta, 1932:79); * (Pereyra, 1938); **(Narosky & Di Giacomo, 1993:64); *** (Darrieu & Camperi, 2001:25)	* Zona ribereña del noreste de Buenos Aires, nidifica desde noviembre a febrero; ** Habitante estival en terrenos abiertos y arboledas en áreas rurales, en amplio sector al este de la provincia. Nidificante. Escaso, emigra en invierno; *** Registros escasos en norte, centro y sur de la provincia
Reserva Natural Otamendi	Campana	34° 14' 3.12"S, 58° 53' 9.96"O	* (Babarskas et al., 2003:84)	* Raro, visitante ocasional en el monte ribereño. Un ejemplar observado asentado en una rama de sauce en la selva marginal el 14 de septiembre de 1991
Camino hacia Paraná de Las Palmas	Campana	34° 19' 22.22"S, 58° 28' 47.5"O	(López Lanús & M. Babarskas, inéd.)	Brocca (1997) registró un individuo en el camino que conduce al Paraná de las Palmas. Probable nidificante.
Establecimiento El Toro	Las Flores	36° 6' 4"S, 58° 52' 27"O	(Daguerre, 1922:267)	Aparece en noviembre y permanece hasta febrero.
Arroyo Gualichu	Las Flores	36° 6' 15"S, 58° 42' 2"O	(Daguerre, 1922:267)	Aparece en noviembre y permanece hasta febrero.
Reserva Natural del Pilar	Pilar	34° 24'45"S, 58° 54' 57"O	(Ilincheta, 2011)	Observado el 01-11-2011, nido con un huevo y un pichón.
La Balandra	Berisso	34° 56' 2.076"S, 57° 42' 55.871"O	(Isacch et al., 2006:423)	Visitante estival
Magdalena	Magdalena	35° 4' 44.868"S, 57° 30' 30.636"O	(Isacch et al., 2006:423)	Visitante estival
Reserva Natural Privada El Destino	Magdalena	35° 7' 52.608"S, 57° 23' 13.811"O	(Isacch et al., 2006:423)	Visitante estival
Partido de Berisso		34° 53' 0"S, 57° 54' 0"O	(Klimaitis, 1975:280)	Común en ciertos años; en otros no se lo ve.
Bahía Blanca	Bahía Blanca	38° 42' 0"S, 62° 16' 0"O	(Marelli, 1933:196)	
Establecimiento Los Álamos	Baradero	33° 51' 46.692"S, 59° 25' 3.431"O	(Mérida & Bodrati, 2006:79)	Escaso; población estival más numerosa
Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero	Moreno	34° 41' 5.02"S, 58° 51' 29.22" O	(Morici, 2012b)	
Reserva Natural Punta Lara (RNPL)	Ensenada y Berazategui	34° 47' 26.988"S, 58° 0' 35.568"O	(Pagano et al., 2012:120)	Presencia indeterminada.
Autopista La Plata-Buenos Aires (Peaje Hudson) (RNPL)	Berazategui	34° 46' 26.906"S, 58° 9' 49.573"O	(Pagano et al., 2012:120)	Obs. en vuelo sobre pastizales cercanos a la autopista en julio 2008

Canal Baldovinos (RNPL)	Berazategui	34° 47' 3.876"S, 58° 6' 3.995"O	(Pagano et al., 2012:120)	Registrados dos ejemplares en diciembre 2008
Canal Villa Elisa (RNPL)	La Plata	34° 50' 18.13"S, 57° 59' 47.436"O	(Pagano et al., 2012:120)	Grilli (obs. pers.) observó la especie en diciembre 2007 y enero 2009.
Parque Costero Sur	Magdalena y Punta Indio	35° 19' 29.748"S, 57° 12' 10.152"O	(Pagano & Mérida, 2009:223)	Escaso; visitante estival en pastizales y áreas abiertas, generalmente en pequeños grupos al atardecer, aunque pueden observarse ejemplares aislados durante todo el año. Probable nidificante.
Zelaya	Pilar	34° 22' 14.7"S, 58° 52' 9.48"O	(Pereyra,1932:41); (Pereyra, 1935:96)	Nidos con huevos y pichones, de noviembre a febrero
Gral Villegas	Gral Villegas	35° 1' 57.504"S, 63° 0' 53.423"O	(Roesler, 2001:32)	Obs. una pareja con un juvenil sobre la ciudad
Vuelta de Obligado	San Pedro	33° 45'S, 59° 45'O	(Salvador & Bodrati, 2017)	En ambientes de espinal de la antigua barranca del río Paraná y en los sectores contiguos de bajos de pie de barranca del río y el valle de inundación de arroyos como el de los Cueros, el arroyo Seco, el Espinillo Chico, y el Espinillo, todos afluentes a escasa distancia del río Paraná.