

PROVINCIA DE FORMOSA
(Podager nacunda nacunda)

Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia			* (Contreras et al., 2014:308)	* relativamente común en ciertas épocas del año, al menos en el sector oriental de su territorio. Migratorio marzo-agosto. Los registros de la especie cubren todos los meses del año, pero las poblaciones locales son muy variables en número y constancia puntual. Anida localmente.
El Cantor	Ramón Lista	23° 27'S, 62° 15'O	(Bodrati & Areta, 2010)	Obs. sobrevolando la finca en diciembre 2003
Reserva Natural Formosa	Bermejo	24° 19'S, 61° 43'O	(Chebez et al., 1998)	Citado
Reserva El Bagual	Laishi	26° 14' 32.676"S, 58° 50' 21.228"O	(Di Giacomo, 2005:300)	Residente, con registros para todos los meses del año
Lapango (Actual Puerto Pilcomayo)	Pilcomayo)	25° 22'S, 57° 39'O	(Laubmann, 1930:163)	Una hembra y un macho fueron recolectados por la expedición Krieg el 6 y 8 de septiembre de 1925
Parque Nacional Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 12'S, 58° 00'O	* (López Lanús, 1997:41); ** (Pujalte et al., 1995)	* Escaso; probable residente; ** citado
PN Río Pilcomayo- Laguna Blanca	Pilcomayo		(López Lanús, 1997:41)	Observada
PN Río Pilcomayo- Campo Serventi	Pilcomayo	25° 10' 44.976"S, 58° 4' 30.972"O	(López Lanús, 1997:41)	Observada
Riacho Monte Lindo- Puesto San Luis	Formosa	25° 49'S, 58° 01'O	(López-Lanús & Mencia, 2017:26)	Observada
Ea. La Emilia	Formosa	25° 56' 25.224"S, 57° 53' 41.711"O	(López-Lanús & Mencia, 2017:26)	Observada
Navegación por alrededores de Dalmacia	Formosa	25° 51' 43.9"S, 57° 54' 29.3"O	(López-Lanús & Mencia, 2017:26)	Observada
Ea. Clarín	Pilcomayo	25° 40'S, 58° 00'O	(Narosky & Martelli, 1995:29)	Obs. 1 ejemplar en octubre 1991
Ciudad de Formosa	Formosa	26° 11'S, 58° 11'O	(Wetmore, 1926:21)	Observación de un ejemplar pasando sobre el río Paraguay en agosto 1920; lo mencionó como migratorio, y los datos bibliográficos conocidos son para agosto, septiembre y octubre.