

PROVINCIA DE FORMOSA ( <i>Crypturellus tataupa</i> )				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
<b>Citado para la provincia</b>	(Contreras, 1987)			
<b>Reserva El Bagual</b>	Laishi	(26° 10'S, 58° 56'O)	(Di Giacomo, 2005:209)	Presencia estacional: Residente con registros para todos los meses del año. Poco común
<b>Reserva Natural Formosa</b>	Bermejo	(24° 17'S, 61° 48'O)	(Chebez et al., 1998)	
<b>Sector oriental de la provincia</b>			(Contreras et al., 2014:32)	Residente permanente y anida localmente.
<b>Reserva de Biosfera Laguna Oca</b>	Capital	(26° 14'S, 58° 10'O)	(Gorleri et al., 2011)	
<b>Parque Nacional Río Pilcomayo</b>	Pilcomayo	(25° 04'S, 58° 07'O)	(López Lanús, 1997:23); (SIB, 2024)	Común; residente; probable nidificante; en isletas de monte y selvas en galería. Vocalizaciones todo el año intensificadas en periodo estival; Solitaria, por senderos, críptica y desconfiada; prefiere esconderse antes que volar.
<b>Laguna Blanca</b>	Pilcomayo	(25° 9' 13.536"S, 58° 9' 29.628"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Estero Poí</b>	Pilcomayo	(25° 7' 0.948"S, 58° 10' 48.108"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Seccional Guardaparque Ricardo Fonzo</b>	Pilcomayo	(25° 3' 3.276"S, 58° 5' 49.163"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Abadie-Cué</b>	Pilcomayo	(25° 6' 59.976"S, 58° 8' 59.964"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Lata-Cué</b>	Pilcomayo	(24° 57' 59.97"S, 58° 24' 59.97"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Paso Pomelo (ex-Puesto Santa María o ex-Destacamento Maitú)</b>	Pilcomayo	(25° 9' 59.76"S, 58° 9' 59.76"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Junta Brazo Norte</b>	Pilcomayo	(24° 56' 22.70"S, 58° 15' 25.09"O)	(López Lanús, 1997:23)	
<b>Monte Lindo</b>	Formosa	(25° 49'S, 58° 01'O)	(López-Lanús & Mencia, 2017:24)	

<b>Colonia Dalmacia</b>	Formosa	(25° 51'S, 57° 54'O)		
<b>Navegación Riacho Pilagá</b>	Pirané	(26° 2' 32.28"S, 57° 58' 26.292"O)		
<b>Mojón de Fierro</b>	Formosa	(26° 3' 0"S, 58° 2' 59.999"O)		