

PROVINCIA DE TUCUMÁN (<i>Crypturellus tataupa</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citado para la provincia				(Dinelli, 1929: 272); (Olrog, 1959:28); (Olrog, 1979:15); (Lucero, 1983); (Olrog, 1959:28); (Brandán & Navarro, 2009: 13); (Ortiz et al., 2011:2); (Segura et al., 2014:11)
Dto. Tafí Viejo		(26° 43'S, 65° 33'O)		(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7); (Fanjul, 2010 en Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)
Yerba Buena	Yerba Buena	(26° 49'S, 65° 19'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 macho en 1902
Itico	Chicligasta	(27° 20' 7.08"S, 65° 39' 7.92"O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1M, 1H y 1? en 1909
Taficillo	Tafí Viejo	(26° 40'S, 65° 16'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 2 H en 1929
San Pedro de Colalao	Trancas	(26° 14'S, 65° 29'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 2 M y 2 H en 1946
Monteagudo	Simoca	(27° 31'S, 65° 17'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 M en 1946
El Saladillo	Trancas	(26° 32'S, 65° 15'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 M en 1946
Dto. Leales			(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 H en 1946
Rearte Norte	Trancas	(26° 07'S, 65° 29'O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 M en 1957
Las Mesadas	Monteros	(27° 6' 47.7"S, 65° 35' 49.847"O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1 M en 1962
Santa Inés	Cruz Alta	(26° 55' 43.068"S, 64° 57' 12.24"O)	(Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	Material estudiado: 1? en 2002
Cañada Honda	Burruyacu	(26° 45'S, 65° 07'O)	(Brandán, 2005:6)	Obs. en bosque
Las Juntas	Trancas	(26° 25'S, 65° 30'O)	(Capllonch, 1997)	Nidos
Piedra Tendida	Burruyacu	(26° 30'S, 64° 52'O)	(Capllonch, 1997)	Nidos

Dique San Iganacio	La Cocha	(27° 44'S, 65° 37'O)	(Capllonch, 1997)	Nidos
Valle de Tafí	Tafí del Valle	(26° 51' 53.64"S, 65° 42' 46.691"O)	(Capllonch, 2007:5)	Frecuenta los bosques que rodean al valle y evita las áreas abiertas. Es mucho más abundante a menor altura en las selvas y bosques pedemontanos. Realiza desplazamientos altitudinales luego de criar, descendiendo hacia los pedemontes en Abril y Mayo.
Jardines de Yerbabuena	Yerba Buena	(26° 49'S, 65° 19'O)	(Capllonch & Aráoz, 2007)	
Reserva Provincial La Florida	Monteros	(26° 55' 20.172"S, 65° 46' 38.64"O)	(Fanjul, 2010 en Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	
Dto Lules			(Fanjul, 2010 en Antelo y Brandán Fernández, 2013:7)	
Sierra de San Javier	Lules	(26° 41'S, 65° 23'O)	(Giannini, 2000 en Antelo y Brandán Fernández, 2013:7); (Ortiz y Aráoz, 2014); (Vides Almonacid, 1991 en Antelo & Brandán Fernández, 2013:7); (SIB, 2024)	
Santa Ana	Río Chico	(27° 28'S, 65° 41'O)	(Hartert & Venturi, 1909:264)	
Campos cercanos a ciudad de Tucumán	Capital	(26° 40'S, 64° 7'O)	(Hartert & Venturi, 1909:264)	Ejemplar de Baer y Dinelli
Arroyo Mista	Leales	(27° 11' 7" S, 65° 6' 37" O)	(Ortiz & Ruiz, 2011a:17)	Residente
Reserva San Pablo	Lules	(26° 52'S, 65° 18'O)	(Ortiz et al., 2018:2)	Residente, nidificante.
Parque Biológico Sierra de San Javier	Lules y Yerba Buena	(26° 25'S, 65° 23'O)	(Rougés & Blake, 2001:10); (SIB, 2024)	Capturas en bosque secundario en abril y diciembre