

PROVINCIA DE BUENOS AIRES (<i>Chaetura meridionalis</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Estación Biológica Punta Rasa	La Costa	36° 18' 15.696"S, 56° 46' 28.955"O	(Jaramillo, 2000:3)	12 de noviembre de 1992, se observó un individuo en el camino hacia el faro (M. Rumboll & S. Hilty, com. pers.). Este es el primer informe en Buenos Aires.
PROVINCIA DE CATAMARCA (<i>Chaetura meridionalis</i>)				
Citada para la provincia	(Carma, 2009:217)		En bosques, selvas, sabanas y quebradas en el norte	
PROVINCIA DE CHACO (<i>Chaetura meridionalis</i>)				
Citada para la provincia	(Dabbene, 1917:7); * (Contreras et al., 1990:133); (Di Giacomo, 2005:302)			* Escaso, visitante ocasional; Escasos registros en la estación cálida (febrero, marzo y octubre), careciéndose de registros de anidación local
Parque Provincial Pampa del Indio	Lib. Gral San Martín	26° 16'S, 59° 58'O	(Bodrati & Pietrek, 2000)	
Confluencia de los ríos Paraná y Paraguay hasta la desembocadura del río Tragadero, cerca de Barranqueras		27° 29'S, 58° 56'O	(Chatellenaz, 2005:543)	Obs. en el aire; migrante austral hacia el norte; nidifica en el área;
Parque Provincial Loro Hablador	Güemes	30° 13' 30.70"S, 67° 42' 21.41"O	(Moschione & Bishels, 2004)	
PROVINCIA DE CÓRDOBA (<i>Chaetura meridionalis</i>)				
Citada para la provincia	(Miatello et al., 1991); (Nores, 1996); (Nores 1983: 45); (Nores & Yzurieta, 1981:36); (Rumboll & Hilty en Jaramillo, 2000:3); (Yzurieta, 1995)			En enero y febrero
Departamento de Pocho			(Salvador et al., 2017:52); (Nores, 1983:25); (Miatello, 1991); (Sferco & Nores, 2003:25).	Escaso; permanente, con registros para todos los meses del año.
Departamento Cruz del Eje				
Departamento de Minas				
Departamento San Alberto				
Reserva Natural Chancaní	Pocho	31° 22'S, 65° 28'O	* (Sferco & Nores, 2003:25); (Sferco, 2017:269)	* Frecuente. Generalmente en bandadas de unos 20 individuos volando sobre las copas de los árboles o sobre las represas. Si bien la especie fue observada solo en primavera-verano, Miatello et al. (1991) la registraron también en invierno. ** en diciembre 2015, en

				contraron 2 nidos
PROVINCIA DE CORRIENTES <i>(Chaetura meridionalis)</i>				
Citada para la provincia	(Contreras, 1981; en Contreras et al., 2014:324); * (Di Giacomo, 2005:302)			* Registros para casi todo el año
Parque Nacional Mburucuyá	Mburucuyá	27° 58'-28° 05'S, 57° 59'-58° 08'O	(Chatellenaz et al., 2010:156)	Ocasional; Hábitat: peridomicilio, bosque, pajonal, palmar-pajonal
PROVINCIA DE FORMOSA <i>(Chaetura meridionalis)</i>				
Citada para la provincia	(Contreras, 1987); * (Contreras et al., 2014:324); ** (Di Giacomo, 2005:302)			* Especie relativamente rara en la provincia, con registros poco numerosos pero más densamente distribuidos en el sector occidental del territorio, especialmente al oeste del meridiano de 60o de longitud. En el este, en localidades con mayor densidad de observaciones, se ha avistado a la especie con cierta reiteración no periódica, como si fuera una asidua visitante ocasional. Los registros disponibles señalan la presencia de la especie desde agosto hasta marzo. ** Los datos bibliográficos para Formosa son de febrero, marzo, junio, agosto y diciembre.
Sudeste de la provincia	Laishi		(Contreras, 1993:5)	Observado en 1992 y 1993 a lo largo de la RP 19 que une Puerto Fotheringam (Colonia Cano) con la localidad de Gral Mansilla sobre la RN 11 comprendida en el valle aluvial del del Río Paraguay
Ingeniero Juárez	Matacos	23° 54' 0" S, 61° 51' 0"O	(Esteban, 1953:353)	Tres ejemplares fueron colectados en Ingeniero Juárez en agosto de 1950
Parque Nacional Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 08'S, 58° 15'O	(Pujalte et al., 1995); * (López-Lanús, 1997:42)	* Único registro en el mes de Marzo; visitante de la estación cálida, tal vez inconstante u ocasional en parte Parque. En isletas de monte, selvas en galería, y sabana con palmares.
P. N. Río Pilcomayo (Lata Cué)	Pilcomayo	24° 58' 1.2"S, 58° 25' 12"O	(López-Lanús, 1997:42)	Obs por Gil y colab en 1993. Por lo general observada en vuelo alto sobre todos los ambientes, en grupos de aproximadamente 5-8 individuos o en pareja.
Pilagá y Monte Lindo entre la ruta nacional N° 11 y el río Paraguay	Formosa	Monte lindo: 25° 50' 13.956"S, 57° 58' 16.427"O Pilagá: 26° 1' 40.476"S, 58° 2' 22.272"O	(López-Lanús & Mencia, 2017:26)	En ocho campañas estivales entre los años 2013 a 2015. En Monte Lindo 1-Puesto San Luis (Ea La Emilia) y Pilagá en navegación (Mojón de Fierro)
Reserva Natural Formosa	Bermejo	24° 19'S, 61° 43'O	(Chebez et al., 1998)	
PROVINCIA DE SANTA FE <i>(Chaetura meridionalis)</i>				
Citada para la provincia	(de la Peña, 2020:263)			
Departamento 9 de Julio			(Giai, 1950:162); (de la Peña,	Citado para el departamento. Según De la Peña,

			2006:66)	1977, esta cita es antigua y requiere ser confirmada por registros modernos.
Villa Guillermina	Gral Obligado	28° 15'S, 59° 28'O	(Manassero et al., 2004:32)	Registros obtenidos en zona de bosques y pastizales (Chaco oriental) a unos 16 km al oeste de Villa Guillermina; obs en enero 2003 ejemplares en vuelo alto circulando sobre los bosques,
Villa Ocampo	Gral Obligado	28° 40'S, 59° 31'O	(Hartert & Venturi, 1909:224)	
PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO <i>(Chaetura meridionalis)</i>				
Citada para la provincia	* (Nores et al., 1991:172); ** (Di Giacomo, 2005:302)			* En Santiago del Estero sólo hay registros de primavera y verano (enero, septiembre y noviembre; ** Presencia estacional: Migrante austral que aparece regularmente todos los años. Las fechas extremas registradas de su presencia fueron 7 de septiembre y 31 de marzo.
Isca Yacu	Jiménez	27° 01'S, 64° 36'O	(Dabbene, 1917:7); (Hartert & Venturi, 1909:224); * (Nores et al., 1991:172); (Quiroga et al., 2016:51)	* Especie fue capturada y observada en enero 1906
A 10 km de Los Tigres	Copo	25° 54'S, 62° 37'O	* (Nores et al., 1991:172); (Quiroga et al., 2016:51)	* Especie fue capturada y observada 17 noviembre 1986
Suncho Corral	Juan F. Ibarra	27° 56'S, 63° 27'O	* (Nores et al., 1991:172)	* Especie fue capturada y observada
Norte de Sachayoj	Alberdi	26° 39' 44.856"S, 61° 49' 37.775"O	(Salvador & Eroles, 1994:25); (Quiroga et al., 2016:51)	Observado en dos oportunidades (seguramente el mismo), volando sobre bosque denso, entre 15 Y 20 m de altura encima de la copa de los árboles, a 5 km de la localidad de Sachayoj, el 28 feb 1992.
RN 9	Capital	27° 47' 1.896"S, 64° 19' 8.939"O	(Quiroga et al., 2016:51)	Obs 23-24 octubre 2011
Finca de Dumas	Guasayán	27° 56'S, 65° 21'O	(Quiroga et al., 2016:51)	Obs. bandada el 2 noviembre 2001
PROVINCIA DE TUCUMÁN <i>(Chaetura meridionalis)</i>				
Citada para la provincia	(Lucero, 1983); * (Brandán & Navarro, 2009); ** (Antelo & Brandán Fernández, 2013:102)			* Residente. Poco observable, frecuencia baja; ** Migra hacia el norte en otoño. En sabanas, bosques, selvas y montes.
Las Tipas	Tafí Viejo	26° 61'S, 65° 36'O	(Brandán et al., 2006); (Antelo & Brandán Fernández, 2013:102)	Estacional?; En ambiente urbanizado
Ticucho	Trancas	26° 31'S, 65° 15'O	(Echevarria et al., 1998 en Antelo)	

			& Brandán Fernández, 2013:102)	
San Miguel de Tucumán	Capital	26° 49'S, 65° 13'O -26.8166667	(Antelo, 2000)	
Cañada Honda	Burruyacu	26° 45'S, 65° 07'O	(Brandán, 2005); (Antelo & Brandán Fernández, 2013:102)	Obs. en bosque
Timbó Nuevo	Burruyacu	26° 40'56.46"S, 65° 5' 14.099"O	(Brandán, 2005); (Antelo & Brandán Fernández, 2013:102)	Obs. en plantación citrus
Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Florida	Monteros	27°1' y 27°7' de latitud sur y los 65°38' y 66° de longitud oeste	* (Navarro et al., 2007:12)	* Ocasional (primavera) Obs por única vez grupo numeroso volando a gran altura.
Tapia	Trancas	26° 35'S, 65° 16'O	(Dabbene, 1917:7)	Obs. en noviembre
Embalse Escaba	J. B. Alberdi	27° 39' 46"S, 65° 46° 16"O	(Echevarría & Fanjul, 2016:107-113)	En selva montana que rodea el embalse en primavera, verano; migrante regional
Embalse El Cadillal (sobre la ruta 347 y en márgenes del río Loro)	Trancas	26° 37' 4.656"S, 65° 11' 13.272"O	(Marigliano et al., 2017:18)	Registro visual durante 2008
Sierra de San Javier	Lules	26° 51'S, 65° 21'O	(Ortiz & Aráoz, 2014)	