PROVINCIA FORMOSA (Tapera naevia)								
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios				
Citado para la provincia	(Contreras, 1987); * (Contreras et al., 1990: 121)	* Faltan registros Junio y Julio; ** Cuenta con numerosos registros dispersos en todo su territorio, sin particulares concentraciones de la densidad en ningún sector. Relativamente común, aunque siempre en baja densidad El análisis de los datos mensuales muestra que en el este su presencia es casi constante, mientras que hacia el oeste se comporta como una especie claramente estacional. Nidificante					
Reserva El Bagual	Laishi	26° 11' 15.6"S, 58° 51' 27.9"O	* (Di Giacomo, 2005:294); ** (Narosky & Lozzia, 1988:8)	* Residente con registros para todos los meses del año; ** Oído por los autores a la mañana temprano; 10 y 14 de setiembre de 1987				
PN Río Pilcomayo	Pilcomayo	25° 5' 2.26"S, 58° 8' 41.17"O		* Citado; ** Residente, habita isletas de monte y sabanas con palmares.				
Laguna Blanca	Pilcomayo	25° 9' 17.46"S, 58° 8' 6.93"O						
Estero Poí	Pilcomayo	25° 3'S, 58° 10' 59.9"O	*(Pujalte et al., 1995);					
Campo Serventi	Pilcomayo	25° 10′ 44.97″S, 58° 4′ 30.97″O	**(López- Lanús, 1997:40)					
Abadie-Cué	Pilcomayo	25° 6' 59.97"S, 58° 8' 59.9"O						
Riacho Monte Lindo (Ea. La Emilia-Puesto San Luis)	Pirané	25° 47' 53"S, 58° 1' 37.1"O		En Isletas de Monte y Palmares				
Riacho Monte Lindo (navegación i/v 15 km entre Dalmacia y Río Paraguay)	Formosa		(López-Lanús & Mencía, 2017:25)					
Riacho Pilagá (navegación i/v 15 km entre Mojón de Fierro y Río Paraguay)	Formosa							
Reserva Nacional Formosa	Bermejo	24° 12′ 31.6″S, 61° 49′ 37.6″O	(Chebez et al., 1998)					