

PROVINCIA BUENOS AIRES (<i>Coccyzus americanus</i>)				
Localidad	Partido	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia		(Pereyra, 1938; Narosky & Di Giacomo, 1993:61; de la Peña, 1999:83; Darrieu & Camperi, 2001:23; de la Peña, 2016:336; de la Peña et al., 2009:106; de la Peña, 2015:302; de la Peña, 2020:96).		Migratorio, visitante estival, en zona ribereña del noreste de la provincia; no nidificante; en bosques y selvas ribereños, y arboledas en áreas rurales.
Partido de Berisso		34° 51' 32.68"S, 57° 52' 37.9"O	(Klimaitis, 1975:279)	Migratoria del Hemisferio Norte, llega a esta zona durante la época calurosa, pero sin llegar a ser común.
Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y alrededores	Ensenada y Berazategui	34° 49' 3.74"S, 58° 5' 29.39"O	* (Klimaitis & Moschione, 1987:279); ** (Pagano et al., 2012:118)	* Muy escasa con pocas observaciones en los sauzales y matorrales durante la primavera y verano; ** Presencia indeterminada. No registrada durante los muestreos. Muy escasa con pocas observaciones en los sauzales y matorrales durante la primavera y verano en la RNPL
Área Natural Protegida “Dique Ingeniero Roggero”	Moreno, Merlo, Marcos Paz y General Rodríguez	34° 41' 6.6"S, 58° 51' 17.89"O	(Morici, 2012:49)	Ocasional, en Arboledas, montes exóticos, autóctonos, forestaciones, bosquecillos, campos arbustivos.
Reserva Ecológica Costanera Sur	CABA	34° 36' 26.35"S, 58° 21' 7.77"O	* (Pugnali & Chamorro, 2008:6); ** (EcoRegistros, 2025)	* Accidental; No residente, registrada solo una vez o en muy pocas ocasiones y fuera de su rango de distribución conocida; ** 1 registro, en https://www.ecoregistros.org/ficha/Coccyzus-americanus&idlugar=15