

PROVINCIA SANTIAGO DEL ESTERO (<i>Coccyzus americanus</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia			(Nores et al., 1991:170; de la Peña, 1999:83; de la Peña et al., 2009:106; de la Peña, 2015:302; de la Peña, 2016:336; de la Peña, 2020:96; eBird, 29 observaciones en https://ebird.org/species/yebcuc/AR-G)	Frecuente en toda la provincia; migrante estival.
Estación Experimental “La María” (INTA)	Loreto	28° 03'S, 64° 15'O	(Codesido & Bilenca, 2004:547)	Citado por el autor
Reserva Natural Copo	Copo	25° 55'S, 62° 05'O	* (López de Casenave et al., 1998:430); ** (Quiroga et al., 2020:4); *** (SIB 2025)	* En bordes e interior bosques en Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991; ** Registros en P. N. Copo el 11 de diciembre de 2016, en RP 16 (Dpto. Copo) al límite con Chaco el 22 y 23 de diciembre de 2016, y sobre RP 92 (Dpto. Copo) el 7 de diciembre de 2018 (eBird, 2019). Hasta la actualidad todos los registros se concentran al noreste de esta provincia en el Dpto. Copo, por lo que ampliamos su distribución hacia el centro provincial; *** Presencia regular
Pampa de los Guanacos	Copo	26° 13' 57"S, 61° 50' 22"O	* (Nores et al, 1991:170); (López de Casenave et al., 1998, citado en Quiroga et al., 2020:4)	* Abr-1956 (1) (colección FML);
Campo F. Cantos (INTA)	Silípica	28° 01' 26"S, 64° 18' 02"O	(Coria et al. 2021:59)	En Áreas Protegidas de Copo durante época estival 1990-1991 Mar-1997-1998
Villa Robles	Robles	27° 55' 13"S, 64° 06' 35"O	(Coria et al. 2021:59)	Marzo 2011