

PROVINCIA CHACO (<i>Coccyzus euleri</i>)				
Localidad	Departamento	Coordinadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia	(de la Peña, 1999:84; * Di Giácomo, 2005:288; de la Peña & Salvador, 2016:338; de la Peña, 2015:303; de la Peña, 2020:99; EcoRegistros 20 registros en en https://www.ecoregistros.org/ficha/Coccyzus-euleri ; eBird 2025, en https://ebird.org/species/pebcuc1/AR-N)			* Fue citado para la provincia de Chaco sobre la base de registros para la Reserva de Copo, situada en el área limítrofe de Santiago del Estero, para los meses de marzo y abril (Contreras et al. 1990), pero este dato es considerado dudoso por Chebez (1994) (Ver NOTA al final)
A 200 m RN16 (Ruta Nicolás Avellaneda)	1º de Mayo	27º 23'S, 58º 50'O	(Bodrati, 2005:31)	El 12 de diciembre de 1998, A. Bodrati observó un ejemplar en el estrato medio de una densa formación de selva en galería de albardón, que se intercalaba con pajonales, lagunas y un extenso madrejón, ambiente propio del valle aluvional del río Paraná. Este registro representaría la primera cita para la provincia de Chaco
P. P. Loro Hablador	Alte. Brown y Gral. Güemes	25º 28'S, 61º 54'O	(Moschione y Bishels, 2005)	Citado en en Listado de las aves del parque.

NOTA: Como señalan Contreras (1990:119) "...su presencia en el norte argentino, el Paraguay y Bolivia es más probable que lo que los presentes registros hacen suponer. La falta de prospección sistemática y de larga duración y la escasez de estudios regionales no permite, en la región de probable aparición de la especie, especulaciones acerca de su posible presencia.". El argumento de Chébez (1994:426) al poner en duda la observación de Canzioni (en Contreras, 1990:119) no es válido pues responde a la idea de un fijismo de hábitat que no se da en las especies reales: el hallazgo boliviano (Remsen, 1986:25) corresponde a un ambiente muy distinto de aquél en que se halló a la especie en Misiones