

PROVINCIA FORMOSA ( <i>Crax fasciolata fasciolata</i> )				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
<b>Citada para la provincia</b>			(Contreras, 1987); *(Chébez, 1994); (White, 2001); **(Contreras et al., 2014:168); *** (Di Giácomo et al., 2007:182/187); **** (Nores, 1989:67); ***** (eBird 2026)	* Parece tener las mejores poblaciones y la mayor disponibilidad de hábitat para la especie. ** Es una especie cada vez más rara en la provincia, que cuenta con pocos registros, todos ellos en la mitad oriental de su territorio, pero especialmente concentrados en la zona del valle fluvial del Río Paraguay; *** Presente en 5 AICA's de la provincia de Formosa; en el Valle fluvial del Río Paraguay (Dtos Pilcomayo, Formosa, Laishi (26° 10'S, 58° 10'O) "Es un área clave para el muitú"; **** No sobrepasaría con su distribución los 60° de longitud occidental; ***** 137 registros de fotos y audios en <a href="https://ebird.org/species/bafcur1/AR-P">https://ebird.org/species/bafcur1/AR-P</a>
<b>Reserva "Ea. Guaycolec"</b>	Formosa	25° 59'S, 58° 11'O	*(EcoRegistros 2026); *(Chébez, 2008:231); *** (Di Giácomo & White, 2007:193); **** (Fernández-Duque, 2013:70); ***** (Narosky e Yzurieta, 2010:124);	* 19 registros en <a href="https://www.ecoregistros.org/ficha/Crax-fasciolata&amp;idlugar=1509">https://www.ecoregistros.org/ficha/Crax-fasciolata&amp;idlugar=1509</a> ; ** subsiste una importante población residente y nidificante; *** Población residente y nidificante; **** En la selva en galería del riacho Pilagá, documentada con fotos de cámaras-trampa; ***** Frecuente de ver; *****
<b>Riacho Pilagá</b>	Formosa	26° 05'S, 57° 59'O	(Chébez, 2008:231); *(López-Lanús & Mencia, 2017:5); *(Ramírez-Llorens et al., 2003:38)	* Registros que confirman la significativa abundancia de la especie a nivel local y amplios sectores de los riachos; Rara; Registrada y grabada en 16 sitios; en bolsones de bosque con aspecto primario en los recodos más forestados, pero sensiblemente menos comunes o directamente ausentes en bosque secundario o muy degradado: ** 43 avistajes entre agosto de 1997 y enero 2001, en la selva en galería del Riacho Pilagá
<b>Riacho Monte Lindo</b>	Formosa	25° 49'S, 58° 01'O	*(López-Lanús & Mencia, 2017:5)	
<b>Riacho He He</b>	Pilcomayo	25° 37'S, 57° 51'O	(Chébez, 2008:231); *(Moschione & Banchs, 2007:202)	* Registrado
<b>Campo Bouvier</b>	Pilcomayo	25° 27'S, 57° 35'O	(Chébez, 2008:231)	Citado
<b>P. N. Río Pilcomayo</b>	Pilcomayo	25° 12'S, 58° 00'O	*(Heinohen Fortabat et al., 1995:999; *(López-Lanús, 1997:32); *** (Di Giácomo, 2007:201); **** (SIB 2026)	* Cita una observación de vestigios de la especie, "dos plumas correspondientes a hembras" en la selva en galería del Río Pilcomayo en Paso Pomelo; ** Presencia estacional indeterminada. En selvas en galería e isletas de monte; *** citado para el parque: **** Presencia sin validar

<b>Departamento Pirané</b>		25° 43'S, 59° 06'O	(de la Peña, 2013:49)	2 nidos en 1972/1973, en noviembre y diciembre. Este dato debería confirmarse, ya que no hay evidencia sobre su presencia en esa localidad.
<b>Reserva "El Bagual"</b>	Laishi	26° 10'S, 58° 56'O	(Di Giacomo et al., 2005:433)	Presencia hipotética, probablemente extinto;
<b>Valle fluvial del Río Paraná-Paraguay</b>	Bermejo, 1° de Mayo y San Bernardo		(Di Giácomo & Moschione, 2007:92)	Registrado
<b>Pilagás</b>	Pirané	25° 7' 5.44"S, 58° 38' 44.98"O	(Moschione, 2007:199)	Se registró ??, aunque la presencia actual debe confirmarse.
<b>Ea. "La Alegría"</b>	Pirané	25° 40'S, 58° 40'O	(Moschione & Casañas, 2007:194)	Podría existir una población de maitú