

PROVINCIA CÓRDOBA (<i>Chauna torquata</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia	(Nores & Yzurieta, 1980); (Yzurieta, 1995); (Nores, 1996); (Salvador et al., 2017:16); (eBird 2026: 1101 observaciones, 151 fotos, 5 audios en https://ebird.org/species/souscr1/AR-X)			Común; Permanente con registros para todos los meses del año.
Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa	Juárez Célman	33° 36'S, 63° 40'O	(Brandolín et al., 2007:4)	Obs. en la laguna en primavera y verano
Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza	San Justo	30° 20'S, 62° 50'O	(Bucher & Herrera, 1981:116); (Torres & Michelutti, 2006:245); (Bruno & Vivas, 2020)	Frecuente, todo el año.
Valle de los Reartes	Calamuchita	31° 60'S, 64° 50'O	(Castellanos, 1931:387)	Febrero 1918
Morteros	San Justo	30° 42'S, 62° 00'O	(De la Peña, 2013:24)	
Villa María y alrededores	Gral San Martín	32° 24'S, 62° 14'O	(Salvador, 1983)	
Bañados del Río Dulce (o Río Petri)	Río Seco, San Justo, Tulumba y Río Primero	30° 4' 47.74"S, 62° 38' 31.34"O	(Torres & Michelutti, 2006:245)	Común, nidificante, todo el año. El autor comenta " <i>En los Bañados del río Dulce se observan concentraciones invernales no reproductivas de hasta 1.200 individuos</i> "