

PROVINCIA FORMOSA (<i>Dendrocygna viduata</i>)				
Localidad	Departamento	Coordenadas	Referencias	Comentarios
Citada para la provincia	(Contreras, 1985; Contreras, 1987; Di Giacomo, 2005:231; Gorleri et al., 2011; Contreras et al., 2014:76; de la Peña, 2015:112; de la Peña, 2025:102; eBird, 361 observaciones, 31 fotos, 2 audios en https://ebird.org/species/wfwduc1/AR-P)			En general, localmente es moderadamente más común, pero focalmente puede llegar a ser muy numerosa. Realiza desplazamientos regionales relacionados con la disponibilidad de agua y alimento, especialmente en la época postreproductiva, razón por la que sus poblaciones disminuyen hacia fines del verano. La ausencia de registros en esta época deriva de la pobreza de la prospección realizada en esos meses, sumada a la movilidad postreproductiva de la especie. Cuenta con numerosos registros distribuidos en todo el territorio, pero especialmente densos en las zonas arroceras del este, en los esteros centrales derivados del Río Pilcomayo, y a lo largo de los cursos de los ríos limítrofes. Ambiente fluviales y humedales (riachos, lagunas, embalses, madrejones, etc. Migrante austral (aunque no aprta datos al respecto); Rara; Es una especie residente permanente, que se reproduce localmente en forma colonial o en pequeñas agrupaciones de nidos.
Bajo curso Río Pilcomayo (Fortín Donovan)		No localizado	(Kerr, 1982:146)	Fue dada a conocer localmente por el autor para el bajo curso del Río Pilcomayo, en áreas fronterizas paraguayas (cerca de Fortín Donovan?).
San José	Pilcomayo	-25.25, -58.25	(Laubmann, 1930:50)	En octubre y febrero
Yuncá Viejo (actual Fortín Sargento Primero Leyes)	Patiño	-24.55, -59.38333333333333	(Laubmann, 1930:50)	En octubre y febrero
P. N. Río Pilcomayo	Pilcomayo	-25.08396, -58.14477	(Pujalte et al., 1995)	Registrado
			(SIB 2026)	Presencia sin validar
P. N. Río Pilcomayo (Laguna Blanca)	Pilcomayo	-25.15346, -58.13436	(López Lanús, 1997:24)	Regularmente asociada a <i>D. autumnalis</i> en bandadas mixtas. Grupos de 10-20 ejemplares en la orilla de la laguna desprovistos de huajosales. Por lo general, las bandadas se separan de la otra especie cuando despegan. Oída en vuelo en sus desplazamientos nocturnos. Sujeta su observación a movimientos locales.

Ea. El Aguará	Pilcomayo	-25.6666667, -58	(Narosky & Martelli, 1995:29)	En retenciones con vegetación palustre.
Reserva Nacional Formosa	Bermejo	-24.2087778, -61.82711111111111	(Chébez et al., 1998)	Citado
			(SIB 2026)	Presencia regular validada
Riacho Monte Lindo (Ea. San Luis y navegación parcial alrededores Colonia Dalmacia)	Patiño	-25.8166667,-58.01666666666666	(López-Lanús & Mencia, 2017:24)	Registrado
Bañado La Estrella (Fortín Soledad y Vertedero)	Bermejo/Patiño	-24.638366, -60.527985	(EcoRegistros 2026)	11 registros en https://www.ecoregistros.org/ficha/Dendrocygna-viduata&idlugar=623